LIMITES DE FONCTIONS

I. Limites et asymptotes :

1°) Limites infinie en $+\infty$ ou en $-\infty$:

Les définitions vues pour les suites s'étendent aux fonctions :

Définition :

Dire qu'une fonction f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$, signifie que tout intervalle $]A ; +\infty[$ avec A réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand.

C'est à dire que pour tout A réel, il existe x_0 appartenant à $\mathbb{R}$ tel que pour tout $x > x_0$ on a $f(x) > A$.

Sur la figure, on a $f(x) > A$ dès que $x > x_0$.

Notation :

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Définition :

De même, dire qu'une fonction f a pour limite $-\infty$ en $+\infty$, signifie que tout intervalle $]-\infty ; A[$ avec A réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand.

Notation :

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Exemple :

À l'aide de la définition, montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$.

Soit A un réel positif. Pour que $x^2 > A$, il suffit que $x > \sqrt{A}$. Donc pour tout réel x assez grand, ici supérieur à $\sqrt{A}$, tous les $f(x)$ se trouvent dans $]A ; +\infty[$.

Théorème :

Limites de référence (admis)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| = +\infty.$$

De façon analogue, on peut définir la limite en $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} |x| = +\infty.$$

Pour tout entier naturel n non nul, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$.

Pour tout entier naturel n pair non nul, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$.

Pour tout entier naturel n impair, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

2°) Limite finie en l'infini :

Définition :

Soit l un réel. Dire qu'une fonction f a pour limite l lorsque x tend vers $+\infty$ signifie que tout intervalle ouvert contenant l contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand.

Notation :

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

Remarque :

On a une définition analogue en $-\infty$.

Théorème : (limites de référence)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 ;$$

Pour tout entier naturel n non nul, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n}$

Définition :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \Leftrightarrow$ la droite d'équation $y = l$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ à la courbe représentative de f .

Exemple :

Voir les deux graphiques ci-dessus.

3°) Limite infinie en une valeur a ($a \in \mathbb{R}$) :

Définition :

Dire qu'une fonction f a pour limite $+\infty$ en a , signifie que tout intervalle $]A ; +\infty[$ avec A réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

Sur la figure, on a $f(x) > A$ dès que x est assez proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$.

On a la même définition lorsque x tend vers a par des valeurs supérieures à a .

On note $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$.

On a également les mêmes définitions et notations lorsque $f(x)$ tend vers $-\infty$:

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$.

Remarque :

Dans le cas où $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, on dit que la limite en a de f n'existe pas.

Dans le cas où $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, on dit que la limite en a de f existe et est égale à la limite à droite et à gauche en a .

Exemple :

Pour la fonction dont nous avons la représentation graphique ci-contre, nous avons

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

Théorème :

Limites de référence (admis)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty ;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty.$$

Définition :

Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm \infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm \infty$.

On dit que la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à la courbe C_f .

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{1}{x+2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty.$$

Conséquence pour la courbe : la droite d'équation $x = -2$ est une asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f .

II. Opérations sur les limites :

1°) Limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient :

Les résultats sont les mêmes que ceux obtenus pour les limites de suites, que l'on fasse la limite de fonction en $+\infty$, mais également en $-\infty$ ou en un nombre.

Pour vous entraîner : [lien 1](#) ou

[lien 2](#) ou

2°) Composée de deux fonctions :

Propriété (admise) :

Soient deux fonctions : u définie de I dans J et f de J dans $\mathbb{R}$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(u(x)) = c$.

Exemples :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} x-2 = 0^+ \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2+x+2 = 4 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2+x+2} = 2.$$

Pour vous entraîner : [lien](#) ou

3°) Polynômes et fonctions rationnelles :

Exemple : fonction polynôme

Méthode pour lever une indétermination : factoriser par le terme de plus haut degré.

$$\text{Soit } f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3 = 5x^3 \left(1 - \frac{2}{5x} + \frac{3}{5x^3} \right).$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5x^3 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{5x} + \frac{3}{5x^3} \right) = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (par multiplication des limites).

Exemple : fonction rationnelle

Méthode pour lever une indétermination : factoriser par le terme de plus haut degré le numérateur et le dénominateur puis simplifier.

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 - x + 2}{x^2 - 1} = \frac{2x^3 \left(1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x^3}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{2x^3}{x^2} \frac{1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 2x \frac{1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}}.$$

On constate que la fraction de droite tend vers 1. La limite de f est donc la même que celle de $2x$. L'indétermination est levée.

Regarder aussi la méthode 8 p 61 de votre livre

III. Théorèmes de comparaison :

1°) Théorème des gendarmes :

Théorème :

Soient f, g, h trois fonctions et L un réel.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = L$ et si pour x assez grand $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

Preuve :

Soit I un intervalle contenant L .

Pour x assez grand on a à la fois $g(x) \in I, h(x) \in I$ et $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$.

On en déduit que $f(x) \in I$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

Remarque :

Ce théorème s'étend au cas où x tend vers un nombre a .

Exemple :

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sin(3x)}{x^2}$. Déterminer sa limite en $+\infty$.

Comme $-1 \leq \sin(3x) \leq 1$, on a $-\frac{1}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{x^2}$; or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x^2} = 0$

On en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2°) Comparaison à l'infini :

Théorème :

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et si pour x assez grand $g(x) \leq f(x)$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ et si pour x assez grand $g(x) \geq f(x)$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Remarque :

On a évidemment les propriétés analogues en $-\infty$.

3°) Croissances comparées :

Propriété :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

Preuve de la première limite (exemplaire) :

Pour tout réel X , on sait que $X < e^X$ (voir graphique ci-contre où $x + 1 \leq e^x$).

On pose $X = \frac{x}{n+1}$, l'inégalité précédente nous donne donc $\frac{x}{n+1} \leq e^{\frac{x}{n+1}}$.

La fonction $t \mapsto t^{n+1}$ étant croissante sur $]0 ; +\infty[$, on peut donc écrire :

pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $\left(\frac{x}{n+1}\right)^{n+1} \leq \left(e^{\frac{x}{n+1}}\right)^{n+1}$, c'est-à-dire $\frac{x^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \leq e^x$.

En divisant les deux membres par x^n , on obtient : $\frac{x}{(n+1)^{n+1}} \leq \frac{e^x}{x^n}$ (car $x^n > 0$ sur $]0 ; +\infty[$).

Pour tout n de $\mathbb{N}$, $(n+1)^{n+1}$ est une constante et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(n+1)^{n+1}} = +\infty$, et donc, par

comparaison, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.

En conclusion :

Pour déterminer la limite d'une fonction, on dispose de plusieurs méthodes :

- Appliquer les règles sur les opérations (addition, multiplication, division) ;
- Reconnaître la limite de la composée de deux fonctions ;
- Utiliser les théorèmes de comparaison ;
- Procéder à des changements d'écriture (factoriser, multiplier par l'expression conjuguée, ...) ...